MeliaBisolvon

MD **Ιατροτεχνολογικό προϊόν**

Ξηρός βήχας και ερεθισμένος λαιμός

Althaea officinalis και Μέλι

100 ml Σιρόπι

5 ml του MeliaBisolvon περιέχουν 125 mg ξηρό εκχύλισμα ρίζας Althaea officinalis και 1875 mg Μέλι.

Άλλα συστατικά: γλυκερόλη, μαλτοδεξτρίνη

5 ml του MeliaBisolvon περιέχουν 0.29 BU (bread unit). (1 bread unit αντιστοιχεί σε 12 g εύπεπτων υδατανθρακών).

Το MeliaBisolvon ηρεμεί το ξηρό βήχα και ανακουφίζει από τον πονόλαιμο.

Χρησιμοποιείται για:

- Να ανακουφίσει από τον ξηρό και επίμονο βήχα και την παρόρμηση για βήχα
- Να καταπραΰνει και να ανακουφίσει τον επώδυνο και φλεγμονώδη στοματικό φαρυγγικό και λαρυγγικό βλεννογόνο
- Να καλύψει τον βλεννογόνο προστατεύοντας ενάντια σε εξωτερικούς παράγοντες που προκαλούν ερεθισμό του λαιμού
- Να βοηθήσει έναντι της φλεγμονής του λαιμού σχηματίζοντας μία προστατευτική επίστρωση
- Να ανακουφίσει από τα συμπτώματα δυσφορίας του λαιμού όπως ο ξηρός, κνησμώδης, τραχύς λαιμός, τα προβλήματα κατάποσης ή η βραχνάδα.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση της κατάστασης σας ή εάν τα συμπτώματα σας επιδεινωθούν, θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν γιατρό.

Χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κουτάλι.

- παιδιά 1 - 5 ετών: έως 3 φορές 2,5 ml την ημέρα
- παιδιά 6 - 12 ετών: έως 3 φορές 5 ml την ημέρα
- ενήλικες και έφηβοι: έως 6 φορές 5 ml την ημέρα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να εξετάσετε πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Εάν έχετε αμφιβολίες ή αν έχετε οποιαδήποτε επιπλέον ερωτήματα, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.

Μη χρησιμοποιείτε το MeliaBisolvon:

- Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευασθησία) σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του MeliaBisolvon. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, παρακαλείσθε να διακόψετε τη χρήση του προϊόντος και να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
- Εάν έχετε σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης επειδή αυτό το σιρόπι περιέχει μέλι.
- Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- Σε παιδιά κάτω του 1 έτους.

Γενικότερα, συμβουλευτείτε έναν γιατρό για τη χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας:

- Εάν τα συμπτώματά σας επιμένουν ή επιδεινωθούν μετά από 1 εβδομάδα από τη χρήση του προϊόντος. Το MeliaBisolvon ενδείκνυται για βραχυπρόθεσμη χρήση και δεν πρέπει να λαμβάνεται για παραπάνω από 1 εβδομάδα χωρίς τη συμβουλή γιατρού.
- Εάν παρουσιάσετε δύσπνοια, πυρετό ή πυώδη πτύελα
- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια.

Συμπτώματα υπερευαισθησίας μπορεί να εμφανιστούν σε σπάνιες περιπτώσεις. Ωστόσο, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν βιώνετε ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τη λήψη του MeliaBisolvon. Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει προκληθεί σε σχέση με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 213 2040337, Ιστότοπος: http://www.eof.gr, http://www.kitrinikarta.gr • **Κύπρος:** Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: + 357 22608669, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. Το MeliaBisolvon περιέχει γλίσχρασμα προερχόμενο από τις ρίζες Althaea officinalis που σχηματίζει μία προστατευτική επίστρωση πάνω στο στοματικό και φαρυγγικό βλεννογόνο. Έτσι, η απορρόφηση συγχορηγούμενων από του στόματος φαρμάκων μπορεί να καθυστερήσει. Για το λόγο αυτό, το MeliaBisolvon δεν θα πρέπει να λαμβάνεται μισή με 1 ώρα πριν ή μετά τη χορήγηση άλλων από του στόματος φαρμάκων. Να φυλάσσετε σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Μη χρησιμοποιείτε το MeliaBisolvon μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί και στη φιάλη. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Μην ψύχετε και μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Διατηρείτε το μπουκάλι στην αρχική του συσκευασία για να προστατεύεται από το φως. Χρησιμοποιείστε το MeliaBisolvon εντός 3 μηνών μετά το άνοιγμα της φιάλης. Εξαιτίας της φυσικής προέλευσης κάποιων συστατικών, το χρώμα του MeliaBisolvon μπορεί να διαφέρει. Αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην ποιότητα του σιροπιού.

Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα σύνολο προϊόντων αποτελούμενο από το σιρόπι MeliaBisolvon και ένα δοσομετρικό κουτάλι.

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5, 23562 Lübeck, Γερμανία

CE 0482

Union Plastic
ZA Robert BP 27, 43140 Saint-Didier-en-Velay, Γαλλία

CE 0459

Συναρμολογητής της τελικής συσκευασίας:
HÄLSA Pharma GmbH

Opella
Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, 176 74 Καλλιθέα, Αθήνα

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 2026-02

Αριθμός αναθεώρησης: 02

Opella.